

Critères d'inclusions/ NN/ étude OPERA

Version du 29 octobre 2008

	Critères d'inclusion	Critères d'exclusions
<input type="checkbox"/> Décès d'un NN	NN ≥ 22 SA ou ≥ 500 gr : MFIU ; Décès : Per partum ou per opératoire ; ou en salle de naissance ; ou pendant le séjour en maternité ou pendant le séjour en service de réanimation, SI ou néonatalogie	Décès d'un NN dans le cadre d'une IMG Décès dû uniquement à une malformation
<input type="checkbox"/> NN ≥ 35 SA + 0 jours transféré en service de réanimation, SI ou néonatalogie ou unité Kangourou	<input type="checkbox"/> présentant une suspicion clinique de détresse neurologique <input type="checkbox"/> ou présentant un tableau de détresse respiratoire nécessitant une intubation et/ou une ventilation invasive ou non invasive (CPAP) ou O₂ > 2 L / min <input type="checkbox"/> et/ou issu de Grossesse gémellaire	tout NN présentant comme seul critère : <input type="checkbox"/> transfert de NN de mère diabétique <input type="checkbox"/> transfert pour risque infectieux <input type="checkbox"/> DR nécessitant uniquement une oxygénation (sac de Hood) <input type="checkbox"/> transfert pour ictère <input type="checkbox"/> transfert pour malformation , dépistée ou non, en prénatal
<input type="checkbox"/> NN ≥ 35 SA + 0 jours Transféré ou non	<input type="checkbox"/> présentant un RCIU sévère , selon les critères de la courbe de Usher à 41 SA poids < 2600 gr à 40 SA poids < 2550 gr à 39 SA poids < 2500 gr à 38 SA poids < 2300 gr à 37 SA poids < 2100 gr à 36 SA poids < 1900 gr à 35 SA poids < 1700 gr <input type="checkbox"/> présentant une lésion traumatique : fracture MI ou MS, embarrures, paralysie ou parésie du plexus brachial, plaie cutanée <u>nécessitant</u> des points de suture plaie oculaire	NN présentant <u>uniquement</u> un céphalématome ou une fracture de la clavicule ou une plaie sans point de suture